arXiv:1603.01878v2 [math.CV] 12 May 2016

УДК 517.55 + 517.576 + 517.987.1

Голоморфные миноранты плюрисубгармонических функций*

Т. Ю. Байгускаров, Б. Н. Хабибуллин

Пусть D — область в n-мерном комплексном пространстве $\mathbb{C}^n$ с евклидовой нормой $|\cdot|$, $n \geqslant 1$. Через $\operatorname{psh}(D)$ и $\operatorname{sbh}(D)$, а также $\operatorname{Hol}(D)$ обозначаем классы плюрисубгармонических и субгармонических, включая функцию $-\boldsymbol{\infty}$, тождественно равную $-\infty$ на D, а также голоморфных в D функций соответственно; $B(z,r) := \{z' \in \mathbb{C}^n \colon |z'-z| < r\}$ — открытый шар с центром $z \in \mathbb{C}^n$ радиуса $r > 0$. Наиболее глубокий результат о существовании ненулевой функции $f \in \operatorname{Hol}(D)$, в некотором смысле минорирующей функцию $\varphi \in \operatorname{psh}(D)$, — это доказанная Э. Бомбьери [1, теорема существования] методом Л. Хермандера

Теорема HB ([2; теорема 4.2.7]). *Пусть $D \subset \mathbb{C}^n$ — псевдовыпуклая область, $\varphi \in \operatorname{psh}(D)$, $z_0 \in D$,*

$$I^2_\varphi(z_0,r) := \int_{B(z_0,r)\cap D} e^{-2\varphi}\,d\lambda, \quad \text{где } \lambda \text{ — мера Лебега на } \mathbb{C}^n.$$

Тогда для каждого числа $a > 0$ найдется функция $f_a \in \operatorname{Hol}(D)$, такая, что $f_a(z_0) = 1$ и

$$I^2_\varphi(z_0; f_a) := \int_D \frac{\bigl|f_a(z)\bigr|^2 e^{-2\varphi(z)}}{\bigl(1+|z-z_0|^2\bigr)^{n+a}}\,d\lambda(z) \leqslant \left(2 + \frac{(1+r^2)^2(n+1)^2}{ar^{2n+2}}\right)\cdot I^2_\varphi(z_0,r).$$

Поскольку при $-\boldsymbol{\infty} \neq \varphi \in \operatorname{psh}(D)$ для любой точки $z_0 \notin \{z \in \mathbb{C}^n \colon \varphi(z) = -\infty\}$ найдется число $r > 0$, для которого $I^2_\varphi(z_0,r) < +\infty$ [3, следствие 5.11], справедливо

Следствие HB. *В условиях теоремы HB для каждого $a > 0$ найдутся $z_0 \in D$ и ненулевая $f_a \in \operatorname{Hol}(D)$, такие, что $I^2_\varphi(z_0; f_a) < +\infty$. В частности, для достаточно малого числа $b > 0$*

$$\log\bigl|bf_a(z)\bigr| \leqslant \sup_{z'\in B(z,r)} \varphi(z') + n\log\frac{1}{r} + (n+a)\log\bigl(1+|z|+r\bigr) \quad \text{для всех } z \in D \tag{1}$$

и при всех $0 < r < \operatorname{dist}(z, \mathbb{C}^n \setminus D)$, где dist — функция евклидова расстояния.

Вывод неравенства (1) из конечности $I^2_\varphi(z_0; f_a)$ элементарен, поскольку использует лишь субгармоничность функции $|f_a|^2$ (см., например, [4, лемма 9.1]), но это неравенство находит весьма широкие применения в теории функций комплексных переменных и ее приложениях. В случае $n = 1$ и/или специальных областей $D \subset \mathbb{C}$ известны и более тонкие выводы, усиливающие (1) и отчасти учитывающие как субгармоничность функций $\log|f_a|$ и φ, так и то, что $f_a \in \operatorname{Hol}(D)$:

*Поддержано Российским фондом фундаментальных исследований, проект № 16-01-00024а.

[1991 г.] *при* $D=\mathbb{C}$ *для* $r=1$ *в правой части неравенства* (1) *можно оставить лишь* $\sup_{z'\in B(z,1)}\varphi(z')$ [5, доказательство основной теоремы, 2а)–2б)], [4, предложение 9.2];

[1992 г.] *для непрерывной ограниченной сверху функции* $r\colon D\to(0,+\infty)$ *в области* $D\subset\mathbb{C}$, *когда* $r(z)<\operatorname{dist}(z,\mathbb{C}\setminus D)$, $\sup\bigl\{r(z)/r(z')\colon z,z'\in D, |z-z'|\leqslant r(z)+r(z')\bigr\}<+\infty$ *и* $-\log r\in\operatorname{sbh}(D)$, *оценки* (1) *можно усилить усреднением функции* φ, *заменив правую часть на*

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\varphi\bigl(z+r(z)e^{i\theta}\bigr)\,d\theta+\log\frac{1}{r(z)}+4\log\bigl(1+|z|\bigr)\qquad\bigl(\text{см. [6, лемма]}\bigr);\tag{2}$$

[2015 г.] *при* $D=\mathbb{C}$ *для любого числа* $r\in(0,1]$ *при достаточно малом* $b>0$ *правую часть в* (1) *можно заменить на усреднение* $\frac{1}{2\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\varphi(z+re^{i\theta})\,d\theta$ [7, теорема 2].

Теорема 1. *Для псевдовыпуклой области* $D\subset\mathbb{C}^n$ *при* $-\boldsymbol{\infty}\neq\varphi\in\operatorname{psh}(D)$ *для любого числа* $a>0$ *найдется ненулевая функция* $f\in\operatorname{Hol}(D)$, *удовлетворяющая оценке*

$$\log\bigl|f(z)\bigr|\leqslant\frac{n!}{\pi^n r^{2n}}\int_{B(z,r)}\varphi\,d\lambda+n\log\frac{1}{r}+(n+a)\log\bigl(1+|z|+r\bigr)\tag{3}$$

для всех $z\in D$ *и всех* r, $0<r<\operatorname{dist}(z,\mathbb{C}^n\setminus D)$, *где* $n!/\pi^n r^{2n}=1/\lambda(B(0,r))$, *т. е. первое слагаемое в правой части неравенства* (3) — *усреднение* φ *в шаре* $B(z,r)$ *по мере Лебега* λ.

Доказательство. По первому утверждению следствия НВ найдутся точка $z_0\in D$, ненулевая функция $f_a\in\operatorname{Hol}(D)$ и число $C_a>0$, для которых $I^2_\varphi(z_0;f_a)\leqslant C_a$, т. е.

$$\int_D\bigl|f_a\bigr|^2e^{-2\psi}\,d\lambda\leqslant C_a,\quad\psi(z):=\varphi(z)+\frac{1}{2}(n+a)\log\bigl(1+|z-z_0|^2\bigr),\quad z\in D.$$

Лемма. *Пусть* $u\in\operatorname{sbh}\bigl(B(z,r')\bigr)$ *и* $r'>r>0$. *Тогда для любой функции* v, *интегрируемой по мере Лебега* λ *на* $B(z,r)$, *справедливы неравенства*

$$\exp\Bigl(u(z)-\frac{1}{\lambda\bigl(B(0,r)\bigr)}\int_{B(z,r)}v\,d\lambda\Bigr)\leqslant\exp\Bigl(\frac{1}{\lambda\bigl(B(0,r)\bigr)}\int_{B(z,r)}(u-v)\,d\lambda\Bigr)$$
$$\leqslant\frac{1}{\lambda\bigl(B(0,r)\bigr)}\int_{B(z,r)}e^{u-v}\,d\lambda.$$

Первое неравенство здесь следует из условия $u\in\operatorname{sbh}\bigl(B(z,r')\bigr)$, а второе — из интегрального неравенства Йенсена для выпуклой функции exp [8, теорема 2.1].

Применим лемму к $u{:=}2\log|f_a|\in\operatorname{psh}(D)\subset\operatorname{sbh}(D)$ и $v{:=}2\psi$ для произвольных точки

$z \in D$ и r, $0 < r < \operatorname{dist}\bigl(z, \mathbb{C}^n \setminus D\bigr)$ (ниже V_{2n} — объем единичного шара в $\mathbb{C}^n$):

$$2\log\bigl|f_a(z)\bigr| \leqslant 2\,\frac{1}{\lambda\bigl(B(0,r)\bigr)}\int_{B(z,r)} \psi\,d\lambda + \log\frac{1}{\lambda\bigl(B(0,r)\bigr)} + \log\int_{B(z,r)} e^{2\log|f_a|-2\psi}\,d\lambda$$

$$\leqslant 2\,\frac{1}{\lambda\bigl(B(0,r)\bigr)}\int_{B(z,r)} \varphi\,d\lambda + \frac{n+a}{\lambda\bigl(B(0,r)\bigr)}\int_{B(z,r)} \log\bigl(1+|z'-z_0|^2\bigr)\,d\lambda(z') + 2n\log\frac{1}{r} - \log V_{2n}$$

$$+ \log\int_{B(z,r)} |f_a| e^{-2\psi}\,d\lambda \leqslant 2\,\frac{1}{\lambda\bigl(B(0,r)\bigr)}\int_{B(z,r)} \varphi\,d\lambda + (n+a)\log\bigl(1+\bigl(|z-z_0|+r\bigr)^2\bigr) + 2n\log\frac{1}{r}$$

$$- \log V_{2n} + \log C_a \leqslant 2\,\frac{1}{\lambda\bigl(B(0,r)\bigr)}\int_{B(z,r)} \varphi\,d\lambda + 2n\log\frac{1}{r} + 2(n+a)\log\bigl(1+|z|+r\bigr)$$

$$+ 2(n+a)\log\bigl(1+|z_0|\bigr) - \log V_{2n} + \log C_a.$$

Деление неравенств на 2 при $f := bf_a$ с числом $b := (1+|z_0|)^{-n-a}\sqrt{V_{2n}/C_a}$ дает (3). □

Замечание 1. При $n = 1$ правая часть в (3) всегда, причем зачастую и существенно, меньше и лучше, чем (2). Этого нельзя сказать о двух других предшествующих результатах от [1991 г.] и [2015 г.]. Но нам удалось установить, что при $-\infty \neq \varphi \in \operatorname{sbh}(\mathbb{C})$ для любого сколь угодно большого числа $N \geqslant 0$ найдется ненулевая функция $f \in \operatorname{Hol}(\mathbb{C})$, для которой

$$\log\bigl|f(z)\bigr| \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \varphi\left(z + \frac{1}{\bigl(1+|z|\bigr)^N}\,e^{i\theta}\right)\,d\theta$$

для всех $z \in \mathbb{C}$. Доказательство этого [9, следствие 2] и даже более тонких результатов для голоморфных функций одной комплексной переменной см. в [9].

Пусть $\mathcal{M}^+_{\mathrm{c}}(D)$ — класс всех положительных борелевских мер с компактным носителем в области $D \subset \mathbb{C}^n$, а $\mathcal{M}^+_{\mathrm{ac}}(D)$ — подкласс всех абсолютно непрерывных относительно λ мер в нем. Мера $\mu \in \mathcal{M}^+_{\mathrm{c}}(D)$ — называется *выметанием меры* $\mu_0 \in \mathcal{M}^+_{\mathrm{c}}(D)$ относительно $\operatorname{psh}(D)$, если

$$\int \varphi\,d\mu_0 \leqslant \int \varphi\,d\mu \quad \textit{для всех } \varphi \in \operatorname{psh}(D) \quad (\text{пишем } \mu_0 \prec_{\operatorname{psh}(D)} \mu).$$

Теорема 2. *Пусть область $D \subset \mathbb{C}^n$ псевдовыпукла, $\mu_0 \in \mathcal{M}^+_{\mathrm{c}}(D)$, а $F\colon D \to [-\infty, +\infty]$ — интегрируемая по μ_0 и локально интегрируемая в D по мере Лебега λ функция. Если*

$$-\infty < \inf\Bigl\{\int F\,d\mu\colon \mu_0 \prec_{\operatorname{psh}(D)} \mu \in \mathcal{M}^+_{\mathrm{ac}}(D)\Bigr\}, \tag{4}$$

то для любых числа $a > 0$ и непрерывной функции $d\colon D \to (0, +\infty)$, удовлетворяющей условию $d(z) < \operatorname{dist}(z, \mathbb{C}^n \setminus D)$ при всех $z \in D$, для «переменного» усреднения

$$F^{*d}(z) := \frac{1}{\lambda(B(0,d(z)))}\int_{B(z,d(z))} F\,d\lambda, \quad z \in D, \tag{5}$$

найдется ненулевая функция $f \in \operatorname{Hol}(D)$, для которой

$$\log\bigl|f(z)\bigr| \leqslant \frac{1}{\lambda\bigl(B(0,r)\bigr)}\int_{B(z,r)} F^{*d}\,d\lambda + n\log\frac{1}{r} + (n+a)\log\bigl(1+|z|+r\bigr) \tag{6}$$

для всех $z \in D$ и $0 < r < \operatorname{dist}(z, \mathbb{C}^n \setminus D)$.

Доказательство. Условие (4) означает, что для функции F^{*d} из (5) найдется миноранта $\varphi \leqslant F^{*d}$ на D, $-\boldsymbol{\infty} \neq \varphi \in \mathrm{psh}(D)$, если воспользоваться теоремой 7.1 из [4] в пространстве $\mathbb{C}^n$, отождествленном с $2n$-мерным вещественным пространством, с $H := \mathrm{psh}(D) \subset \mathrm{sbh}(D)$ и $F^{(d)} := F^{*d}$. Теперь достаточно применить теорему 1 к миноранте $\varphi \in \mathrm{psh}(D)$. □

Замечание 2. Условие (4), достаточное для существования ненулевой голоморфной миноранты для переменного усреднения функции F в форме (6) очень близкó к необходимому [4, предложение 7.1], если отвлечься от «логарифмических добавок» и усреднений функции F в правой части неравенства (6).

Литература

[1] E. Bombieri, Invent. Math., **10** (1970), 248–263.
[2] L. Hörmander, *Notions of Convexity,* Birkhäser, Boston, 1994.
[3] П. Лелон, Л. Груман, *Целые функции многих комплексных переменных,* Мир, М., 1989.
[4] Б. Н. Хабибуллин, Изв. РАН, сер. матем., **65**:5 (2001), 167–190.
[5] Б. Н. Хабибуллин, Изв. АН СССР, сер. матем. **55**:5 (1991). 1101–1123.
[6] О. В. Епифанов, Матем. заметки, **51**:1 (1992). 83–92.
[7] Т. Ю. Байгускаров, Г. Р. Талипова, Б. Н. Хабибуллин, Алгебра и анализ, 2016 принята к печати.
[8] У. Хейман, П. Кеннеди, *Субгармонические функции,* Мир, М., 1980.
[9] Б. Н. Хабибуллин, Т. Ю. Байгускаров, Матем. заметки, 2016 принята к печати.